

Minnesota Department of Health ການວິຈັຍເບິ່ງການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌

ການວິຈັຍເບິ່ງການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ແມ່ນຫຍັງ?

ເມື່ອບຸກຄົນນຶ່ງມີເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ວິຈັຍເບິ່ງວ່າເຊື້ອໂຣກນັ້ນໄດ້ຕິດຕໍ່ລະບາດໄປຍັງຜູ້ອື່ນແລ້ວບໍ່. ກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ໌ໄດ້ວິຈັຍເບິ່ງເຖິງເຮືອງ ການຕິດຕໍ່ຂອງພຍາດນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການກວດສອບຫາຄວາມຈິງຂອງການຕິດຕໍ່ລະບາດຂອງວັນນະໂຣຄ໌.

ບຸກຄົນໃດທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໂຣກນີ້ ໄປຍັງຜູ້ອື່ນໄດ້ໂດຍງ່າຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ, ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເກີດປວຍໄຂ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບອກກັບທາງແພທຂອງກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ໌ໃນລະຫວ່າງທີ່ເພິ່ນສອບຖາມນັ້ນຈະເກັບເປັນຄວາມລັບ.

ເພິ່ນຈະເຮັດຫຍັງໃນລະຫວ່າງທີ່ເພິ່ນສອບຖາມເຮືອງການຕິດຕໍ່ລະບາດຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌?

ແພທຂອງກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ໌ຈະຖາມທ່ານເຊັ່ນວ່າ ເມື່ອໃດທ່ານເລີ່ມເປັນ ຫຼືຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້. ພຍາຍາມໃຫ້ຄິດທົບທວນຄືນວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄົນ**ທັງຫຼາຍ** ລວມທັງຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄົນນາ ຢາມ, ເດັກນ້ອຍ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄົນທຳງານຮ່ວມກັນ, ແລະຜູ້ມາເຝົ້າ ເບິ່ງລູກ. ໃຫ້ຄິດທົບທວນຄືນທັງຫຼາຍໆອາທິດ, ຫຼາຍໆເດືອນໃນຄາວ ທີ່ທ່ານເລີ່ມປວຍໄຂ້ຫຼືເລີ່ມໂອ. ຈາກນັ້ນແພທສາທາຣະນະສຸຂ໌ຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າຈະໃຫ້ຄົນຜູ້ໄດ້ໄປຮັບການກວດເບິ່ງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບອກກັບແພທສາທາຣະນະສຸຂ໌ນັ້ນຈະເກັບເປັນຄວາມລັບ.

ແພທສາທາຣະນະສຸຂ໌ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຊື່ຂອງທ່ານຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ຫມາຍ ເຖິງວ່າທ່ານບອກຕາມຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ກັບນາຍແພທ.

ນາຍແພທອາດຈະໄດ້ກວດເບິ່ງລະບົບລະບາຍອາກາດຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼືບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງທີ່ທ່ານໃຊ້ເວລາຢູ່ເປັນສ່ວນ ຫຼາຍ. ນີ້ກໍ່ເພື່ອຈະໄດ້ວິຈັຍເບິ່ງວ່າໃຜແດ່ທີ່ຄວນຈະໄປກວດເບິ່ງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌.

ນາຍແພທຈາກທາງສາທາຣະນະສຸຂ໌ຈະນັດຫມາຍໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄປກວດເບິ່ງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກເຂົາວ່າຜູ້ໃດ ມີເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌. ບຸກຄົນໃດທີ່ຢູ່ໄກຫ່າງໄກໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳທ່ານ ຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນຄວນຈະຕ້ອງໄປກວດເບິ່ງເປັນຜູ້ທຳອິດ.


ການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງການຕິດຕໍ່ຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ນາຍແພທຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບຸກຄົນທີ່ຈະໄປກວດນັ້ນເຂົາຕ້ອງໄດ້ໄປກວດໃຫ້ມັນແລ້ວ. ຍ້ອນສາຍເຫດນີ້ ນາຍແພທ

ຈິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ສອບຖາມທ່ານຫຼາຍເທື່ອ. ເພິ່ນຈະຖາມທ່ານ ເປັນບາງຄຳຖາມທີ່ຕ່າງກັນໃນພາຍຫຼັງ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຫມົດທຸກໆຂັ້ນຕອນ. **ໃຫ້ຈຳໄວ້ວ່າ, ສິ່ງທີ່ທ່ານບອກກັບ**

ນາຍແພທນັ້ນຈະ ເກັບເປັນຄວາມລັບ.

ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ທຸກຄົນສາມາດທີ່ຈະຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ໄດ້. ເມື່ອບຸກຄົນໃດທີ່ປວຍໄຂ້ເນື່ອງຈາກມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຢູ່ໃນປອດ ຂອງເຂົາເວລາໄວ, ຫຼືຈາມອອກມາເຊື້ອໂຣກກໍ່ຈະແຜ່ລະບາດອອກໄປໃນອາກາດ



ຖ້າທ່ານຢູ່ໄກບຸກຄົນທີ່ປວຍເປັນ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ທ່ານກໍ່ຈະຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໂຣກຂອງ ເຂົາເຂົ້າໄປໃນປອດຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນທາງນຶ່ງຂອງການຕິດຕໍ່ແລະແຜ່ເຊື້ອຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌.

ທ່ານຈະບໍ່ຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຈາກການຈັບມືຫຼືຈາກເຄື່ອງນຸ່ງອາຫານ, ຖ້ວຍຊາມ, ຫຼືວັດຖຸຕ່າງໆ.

ມີຢາທີ່ດຶງເພື່ອປິ່ນປົວ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນີ້ໄດ້ ທັງເຊື້ອທີ່ມີໃນຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ທັນແຜ່ແລະແບບທີ່ແຜ່ຂະຍາຍ.

ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດລະຫວ່າງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ທີ່ຍັງຝັງຕົວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕິດຕໍ່ລະບາດໄດ້ເທື່ອແລະ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ລະບາດໄດ້?

ໃນເມື່ອ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ, ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະ “ຝັກຕົວນອນຢູ່” ນີ້ເອີ້ນວ່າ “**latent TB infection**” ຫຼືຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “**LTBI.**” “ການຝັກຕົວນອນຢູ່” ຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍເທື່ອ ຫຼືທຳໃຫ້ທ່ານປວຍໄຂ້ໄດ້ເທື່ອ. ການຝັກຕົວນອນຢູ່ຂອງເຊື້ອໂຣກ ຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ. ການສັກຢາເຊື້ອຢາທົດລອງທີ່ໃຫ້ຜົນຫນັງເປັນວິທີ ດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຫຼືບໍ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

“ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ລະບາດຜູ້ອື່ນໄດ້” ເມື່ອເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ມັນ “ຝື່ນຕົວ” ແລະເລີ່ມຂຍາຍຕົວຂຶ້ນ ມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ບຸກຄົນໃດທີ່ມີເຊື້ອ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌



ການວິຈັຍເບິ່ງການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ – ຫນ້າທີ 2

ປະເພດ ນີ້ຈະປ່ວຍໄຂ້ໜັກ. ອາການຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຈະມີ ອາການໄອເປັນປະຈຳ, ຈອຍໂຊ, ນ້ຳໜັກລົດ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ເທື່ອອອກຕອນກາງຄືນ, ເປັນໄຂ້, ແລະເຈັບຕາມໜ້າເອິກ. ຖ້າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຢູ່ໃນປອດຂອງເຂົາມັນສາມາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ລະ ບາດໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້.

ມີປະມານ 10% ຂອງຄົນທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄທີ່ນອນຝັກຕົວຢູ່ນັ້ນ **ຜືນຕົວຂຶ້ນ** ແລະສາມາດຕິດຕໍ່ໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້. ຖ້າທ່ານຫາກ ມີບັນຫາກັບສຸຂະພາບອື່ນໆ, ການສ່ຽງເປັນໄປໄດ້ສູງ.

ຖ້າຂ້ອຍມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄສາມາດຕິດຕໍ່ໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້, ຂ້ອຍຄວນປ້ອງກັນຄົນໃນຄອບຄົວແລະກຸ່ມເພື່ອນໄດ້ຢ່າງໃດ?

1. ກິນຢາຮັກສາຕົວຕາມຄໍາສັ່ງຂອງໝໍ. ເມື່ອເວລາທ່ານ ເລີ່ມກິນຢາຮັກສາເຊື້ອວັນນະໂຣຄນັ້ນ, ທ່ານໝໍຍັງຈະ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດເບິ່ງອີກເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຢາມັນໄດ້ ຜົນດີຊ່າໃດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢາໄດ້ຂ້າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານໝໍຍັງຕ້ອງໃຫ້ກິນຢາສືບຕໍ່ໄປ, ເພາະທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຣກໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນ.
2. ເຖິງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຣກໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນ ໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໂອທ່ານຕ້ອງປິດປາກ ຂອງທ່ານດ້ວຍເຈ້ຽສຳຮັບເຊັດໜ້າຢູ່ສເນີ.
3. ແພທຈາກທາງສາທາຣະນະສຸຂະພາບນຳວິທີການ ຫລີກລ່ຽງການແຜ່ລະບາດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ.
 - ທ່ານອາດຕ້ອງຢູ່ຫ່າງອອກຈາກສຖານທີ່ສາທາຣະນະ, ບ່ອນທຳງານແລະໂຮງຮຽນ.
 - ທ່ານອາດຕ້ອງຍົກເວັ້ນຜູ້ມາຢຽມຢາມທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນ.
4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບແພທໃນການຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ. ແພທມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄອບຄົວ ຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບສົມບູນດີແລະປອດພິຍາຈາກການຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ.



Tuberculosis Prevention and Control Program
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
1-877-676-5414

www.health.state.mn.us/tb

ຂ້ອຍຮູ້ຈັກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ ຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?

ຖ້າທ່ານໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ ທີ່ຕິດຕໍ່ລະບາດຜູ້ອື່ນໄດ້ນັ້ນ ທ່ານອາດຈະຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໂຣກເຂົ້າ ໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄປກວດ ເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄບໍ່.

ນາຍແພທຈະນັດຫມາຍໃຫ້ທ່ານໄປກວດຫາເບິ່ງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ ດ້ວຍວິທີສັກເຊື້ອໂຣກຜັງໄວ້ທີ່ໄດ້ຜິວໜັງ, ການກວດນີ້ຈະບໍ່ເສັຍ

ເງິນ. ຖ້າຜົນການກວດຂອງທ່ານ “ບໍ່ຟົບເຊື້ອ” (ປົກກະຕິ) ນັ້ນກໍຫມາຍ ຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ມີເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເພື່ອຄວາມແນ່ ໃຈ ຫລັງຈາກນັ້ນອີກຫຼາຍອາທິດຕໍ່ມາທຸກໆຄົນຄວນກັບໄປກວດເບິ່ງ ອີກ.

ຖ້າຜົນການກວດຂອງທ່ານ “ຟົບເຊື້ອ” ນັ້ນກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ທ່ານມີເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໄປຟົບ ທ່ານໝໍເພື່ອສ່ອງໄຟຟ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄທີ່ຢູ່ໃນ ຮ່າງກາຍມັນຢູ່ໃນຣະດັບທີ່ນອນຝັກຕົວຫຼືລະດັບທີ່ຈະຕິດຕໍ່ແຜ່ ເຊື້ອໂຣກໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຂ້າເຊື້ອໂຣກ.

ເດັກນ້ອຍຫຼືບຸກຄົນໃດທີ່ມີເຊື້ອ HIV ຫຼືມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆມີໂອ ກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໂຣກທີ່ນອນຝັກຕົວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມັນຕົ້ນຂຶ້ນ ແລະແຜ່ໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກິນຢາເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນການ ກວດນັ້ນບໍ່ຟົບເຊື້ອກໍຕາມ.

ຖ້າທ່ານມີອາການຂອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຈະມີອາການໄອເປັນ ປະຈຳ, ຈອຍໂຊ, ນ້ຳໜັກລົດ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ເອື້ອອອກຕອນ ກາງຄືນ, ເປັນໄຂ້ ແລະເຈັບໜ້າເອິກ. ທ່ານຄວນໄປຫາທ່ານໝໍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນການກວດນັ້ນບໍ່ຟົບເຊື້ອກໍຕາມ.

ຂ້ອຍຄວນເຮັດວິທີໃດຖ້າຜົນການກວດວ່າມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ?

ຖ້າທ່ານເຄີຍມີປະຫວັດມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຈາກຜົນການກວດທີ່ ຜ່ານມາ ທ່ານກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດອີກ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໝັ້ນໄດ້ກວດ, ຈົ່ງໄປກວດ, ການກວດນີ້ເປັນຜົນດີບໍ່ໄດ້ເສັຍຫາຍຫຍັງ.

ເຊື້ອຢາວັກຊີນ BCG vaccine ແມ່ນຫຍັງ?

ເຊື້ອຢາວັກຊີນ BCG ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນທ່ານຈາກເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ຕລອດໄປ. ເຊື້ອຢາວັກຊີນ BCG ຈະບໍ່ໃຫ້ກໍເກີດເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ດ້ວຍວິທີສັກເຊື້ອໂຣກຜັງໄວ້ທີ່ໄດ້ຜິວໜັງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ແລ້ວກໍຖືວ່າປອດພິຍາ