

# ការព្យាបាល រោគរលាកមិនទាន់ចេញមុខ


ការពិសោធន៍រោគរបស់អ្នកបង្ហាញឲ្យឃើញ ថាអ្នកមានឆ្លងរោគរលាកមិនទាន់ចេញមុខ ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Latent TB Infection ឬហៅកាត់ថា “LTBI” ។ មេរោគរលាកមួយចំនួនតូចបានឆ្លងទៅផ្នែក(អវយវៈ)ជាច្រើននៃខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក ដូចជាសួត ឆ្អឹង ឬវក់(ដំរង់នោម)របស់អ្នក ។

មេរោគរលាកឥឡូវនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យអ្នកទេ ។ វាកំពុងតែ “ដេកលក់” ប៉ុន្តែវាមានជីវិតរស់នៅជាដដែល ។ មេរោគរលាកនឹង “ដេកលក់” ដរាបណារូបកាយរបស់អ្នកអាចធានាសុខភាពបាន ។ នៅពេលណាអ្នកមាន LTBI នោះអ្នកមិនអាចចម្រុះរោគរលាកទៅមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានឡើយ ។

បើរូបកាយរបស់អ្នកឈប់ធានាសុខភាពមេរោគរលាក នោះវានឹង “ភ្ញាក់” ហើយក៏ចាប់ផ្តើមដុះដាលឡើង ។ **ការនេះអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់ៗរូបដែលមាន LTBI នៅពេលណាមួយ ។** កាលបើមេរោគដុះដាលឡើង ហើយឆ្លងរាលដាល នោះគេហៅថា “រោគរលាកសកម្ម” ។ មនុស្សដែលមានរោគរលាកសកម្ម អាចឈឺធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង ហើយអាចចម្រុះរោគរលាកទៅអ្នកដទៃ ។

## តើខ្ញុំអាចការពាររោគរលាកសកម្ម ដោយរបៀបណា?

សព្វថ្ងៃនេះមានថ្នាំពេទ្យជាច្រើន ដែលអ្នកអាចលេបបាន ដើម្បីការពារអ្នកកុំឲ្យមានរោគរលាកសកម្ម ។ ថ្នាំឈ្មោះ Isoniazid (INH) គឺជាថ្នាំធម្មតាម្យ៉ាងដែលបានប្រើសំរាប់ព្យាបាល LTBI ។ ថ្នាំ INH នឹងសំឡាប់មេរោគរលាកដែលកំពុងតែ “ដេកលក់” មុននឹងវាមានឱកាសធ្វើឲ្យអ្នកឈឺធ្លាក់ ។ ពីព្រោះតែមេរោគរលាកខ្លាំងរឹងរូស ម្ល៉ោះហើយវានឹងប្រើពេលជាច្រើនខែ ទើបថ្នាំពេទ្យអាចសំឡាប់មេរោគរលាកបាន ។



ថ្នាំ INH មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អ បើសិនជាអ្នកលេបវាជាម្សៅរាល់ថ្ងៃ រហូតទាល់តែគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ប្រាប់អ្នកថាអ្នកអាចឈប់លេបវាទៀត ។ ត្រូវកុំលេបថ្នាំ INH របស់អ្នកជាមួយម្ហូប ។

អ្នកគួរតែទៅជួបអ្នកផ្តល់ការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកមួយខែម្តង ក្នុងកាលដែលអ្នកកំពុងតែលេបថ្នាំ INH ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាការព្យាបាលរបស់អ្នកកំពុងតែមានដំណើរយ៉ាងល្អ ។

## តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំ បើខ្ញុំពុំមានការឈឺធ្លាក់ផងនោះ?

ថ្នាំ INH នឹងសំឡាប់មេរោគរលាកនៅក្នុងរូបកាយរបស់អ្នក មុននឹងវាមានឱកាស “ភ្ញាក់” ពីដេក ហើយធ្វើឲ្យអ្នកឈឺធ្លាក់ ។ សូមចាំថា មេរោគរលាករាយនឹងសំឡាប់បានស្រួលជាង ក្នុងកាលដែលវាកំពុងតែ “ដេកលក់” ។

## តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរត្រូវដឹង អំពីថ្នាំសំរាប់ LTBI?

មនុស្សជាច្រើនដែលលេបថ្នាំ INH ជាម្សៅរាល់ថ្ងៃ គឺពុំមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ក៏ប៉ុន្តែមានការខ្លះដែលអ្នកគួរតែហ្នឹងចាំដឹង :

- មានគ្រុនក្តៅលើសពីចំនួនបីថ្ងៃ
- មិនសូវឃ្លានអាហារ ស្រកទម្ងន់ ឬអស់កំឡាំងកំហែង ដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីសោះ
- មានរមួលពោះ ឬក្អកក្អាយ :  
មនុស្សខ្លះមានរមួលពោះបន្តិចបន្តួច នៅពេលគេចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំ INH ។ បើមានការនេះកើតឡើងដល់អ្នក សូមព្យាយាមបរិភោគអាហារបន្តិចបន្តួច នៅពេលលេបថ្នាំរបស់អ្នក ឬលេបវានៅពេលចូលដំណេក ។ បើអ្នកនៅតែរមួលពោះជាដដែល បន្ទាប់ពីថ្ងៃក្រោយមក នោះត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកជាបន្ទាន់ ។

- មានឈឺក្នុងដុំបារពោះរបស់អ្នក
- មានទឹកនោមស្រអាប់ (ពណ៌ទឹកតែ ឬទឹកកាហ្វេ)
- មានលឿងស្បែក ឬលឿងភ្នែក
- មានកន្ទួលស្បែក ឬរមាស់
- មានស្លឹកស្រពន់ ឬឈឺធ្មេញនៅដៃ ឬនៅប្រអប់ដើមរបស់អ្នក
- មានភ្នែកលើសពីចំនួនបីអាទិត្យ
- បែកញើសនៅពេលយប់

បើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីមួយទាំងនេះ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកជាបន្ទាន់ –សូមកុំរង់ចាំដល់ពេលណាត់ជួបនៅលើកក្រោយឲ្យសោះ ។

## ចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗទៀត :

- **ការផឹកស្រា** នៅពេលអ្នកលេបថ្នាំ INH អាចបណ្តាលឲ្យឈឺថ្លើមរបស់អ្នក ។ ចូរកុំផឹកស្រាបៀរ ស្រាស ឬគ្រឿងស្រវឹងអ្វីទៀតឲ្យសោះ រហូតទាល់តែការព្យាបាល LTBI របស់អ្នកបានចប់ ។
- បើអ្នកមានលេបថ្នាំពេទ្យអ្វីផ្សេងទៀត ឬបើអ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ នោះត្រូវតែកុំភ្លេចប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឲ្យសោះ ។



# ការព្យាបាល រោគរបេងមិនទាន់ចេញមុខ ទំព័រទី ២

## បើសិនជាខ្ញុំមិនលេបថ្នាំ តើមានអ្វីកើតឡើង?

បើអ្នកមិនលេបថ្នាំ INH របស់អ្នក ឬបើអ្នកឈប់លេបថ្នាំរបស់អ្នកហ័សពេក នោះអ្នកនឹងឈឺធ្លាក់ដោយសាររោគរបេងសកម្មហើយ ។ ការនេះអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សណាម្នាក់ ដែលមាន LTBI នៅពេលណាមួយជាពុំខាន ។ ចូរកុំរង់ចាំឲ្យការនេះបានកើតឡើងដល់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក ឲ្យសោះ!

## តើខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះ បើសិនជាខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំ BCG ជាបង្ការ?

នៅប្រទេសជាច្រើនដែលមានកើតរោគរបេង នោះមានមនុស្សជាច្រើនបានចាក់ថ្នាំបង្ការម្យ៉ាងគេហៅថា BCG ។ ថ្នាំ BCG អាចការពារក្មេងៗកុំឲ្យកើតរោគរបេង ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពតែពីរបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ។

មនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានចាក់ថ្នាំ BCG ជាបង្ការ ក៏អាចឆ្លងរោគរបេងសកម្មបានដែរ! បើអ្នកបានចាក់ថ្នាំ BCG ជាបង្ការក្តី គង់តែអ្នកនៅអាចការពារខ្លួនអ្នកបានដែរ ដោយលេបថ្នាំសំរាប់ LTBI ។

## ចុះបើសិនជាខ្ញុំគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង់ថ្លៃថ្នាំពេទ្យ តើវាជាយ៉ាងណាទៅ?

សូមសាកសួរគ្រូពេទ្យ ឬពេទ្យរបស់អ្នក អំពីការទទួលបានថ្នាំរបេងជាទេពិក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមីនីសូតា ។

## ចុះបើសិនជាខ្ញុំផ្លាស់ទីលំនៅ?

បើអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅ ទៅនៅរដ្ឋ ឬទីក្រុងដទៃទៀត នោះត្រូវប្រាប់អ្នកផ្តល់ការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក មុននឹងអ្នកប្តូរទីកន្លែង រឺ រៀនគេអាចជួយអ្នកធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានថ្នាំរបេងរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅ ។

**ការពារខ្លួនអ្នក ការពារគ្រួសាររបស់អ្នក និងការពារមិត្តភក្តិរបស់អ្នក កុំឲ្យឆ្លងរោគរបេង  
—ដោយលេបថ្នាំរបេងរបស់អ្នកឲ្យអស់!**

**តើធ្វើដូចម្តេច ឲ្យខ្ញុំនឹកចាំលេបថ្នាំរបេងរបស់ខ្ញុំ បានទៅ?**

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលអ្នកលេបថ្នាំ INH របស់អ្នកជាម្យ៉ាងរាល់ថ្ងៃ ។ បើអ្នកខានលេបជាច្រើនថ្ងៃ ថ្នាំពេទ្យអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ ។ អ្នកត្រូវតែលេបវាជានិច្ច រហូតទាល់តែគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ប្រាប់អ្នកថាអ្នកអាចឈប់លេបវាទៀត ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាមធ្យោបាយខ្លះ ដែលជួយឲ្យអ្នកនឹកចាំបាន :

- ទុកថ្នាំរបស់អ្នក នៅកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចមើលវាឃើញជាម្យ៉ាងរាល់ថ្ងៃ ។
- ប្រាប់សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ឲ្យរំលឹកអ្នកជាម្យ៉ាងរាល់ថ្ងៃ ។
- កត់ចំណាំនៅលើប្រក្រតិទិនរបស់អ្នកជាម្យ៉ាងរាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអ្នកបានលេបថ្នាំរបស់អ្នក ។
- ប្រើប្រអប់រំលើការលេបថ្នាំ ។
- លេបថ្នាំរបស់អ្នកនៅពេលដូចៗគ្នាជាម្យ៉ាងរាល់ថ្ងៃ ។ ឧទាហរណ៍ : នៅពេលបន្ទាប់ពីអ្នកដុសធ្មេញរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីការស្រស់ស្រួបអាហារពេលព្រឹករួច ឬគ្រាន់តែនៅមុនពេលអ្នកចូលដំណេក ។

បើអ្នកខានលេបថ្នាំនៅថ្ងៃណាមួយ សូមសរសេរកត់វាទុក ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកអាចប្រាប់គ្រូពេទ្យ ឬពេទ្យរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកទៅជួបពិនិត្យនៅលើកក្រោយ ។


ឈ្មោះមន្ទីរពិនិត្យរោគ / គ្រូពេទ្យ / ពេទ្យ របស់អ្នក

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

លេខទូរស័ព្ទ #: \_\_\_\_\_

 Tuberculosis Prevention and Control Program  
P.O. Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-5414  
1-877-676-5414  
[www.health.state.mn.us/tb](http://www.health.state.mn.us/tb)