

Мне сделали прививку от туберкулеза (БЦЖ) у меня на родине. Могу ли я всё равно заболеть туберкулёзом?



Люди, сделавшие прививку от туберкулёза, всё равно могут заболеть туберкулёзом.

Защита от туберкулёза с помощью вакцины со временем перестаёт действовать.

Даже если вы были привиты, положительный анализ крови означает, что у вас ЛТИ.

Принимая **лекарства от ЛТИ, вы защититесь от перехода туберкулёза в активную форму.**

## Задержит ли ЛТИ прохождение моего заявления на иммиграцию?



Приём лекарств от ЛТИ **НЕ** замедлит прохождение вашего заявления.



Иммиграционный врач сообщит в ваш департамент здравоохранения, что у вас ЛТИ.



Местный департамент здравоохранения может предложить вам помощь.

Чтобы найти врача, который сможет заказать вам лекарство от ЛТИ, позвоните в местный департамент здравоохранения:

Округ: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control (Отдел эпидемиологии, профилактики и контроля инфекционных заболеваний)  
PO Box 64975, St. Paul, MN 55164  
651-201-5414 или 1-877-676-5414  
[www.health.state.mn.us](http://www.health.state.mn.us)

1/2024

# Что означает наличие у меня латентного туберкулёза (ЛТИ)?



**Вы можете вылечить ЛТИ и предотвратить болезнь для себя и своих близких.**

**mn** DEPARTMENT OF HEALTH

Адаптировано с разрешения Калифорнийской ассоциации специалистов по борьбе с туберкулёзом.

## Что такое латентный туберкулёз (ЛТИ)?

### Как я им заболел(а)?

ЛТИ — это инфекция, вызванная туберкулёзными микробами, которые пребывают в латентном (или спящем) состоянии в вашем организме.

Вы заразились ЛТИ **воздушно-капельным путём** от кого-то, кто болен активным туберкулёзом.

Вы можете заболеть ЛТИ, даже если сделали прививку от туберкулёза.

## Между ЛТИ и активным туберкулёзом есть много различий:

### Человек с ЛТИ:

Не чувствует себя больным

Имеет нормальную рентгенограмму грудной клетки

**Не может распространять туберкулёзные микробы** среди других людей

Лечение может предотвратить активную форму туберкулёза

Лечение короче (**три–четыре месяца**) и легче

### Человек с активным туберкулёзом:

Может чувствовать себя больным

Рентгенограмма может показывать заболевание


**Может распространять туберкулёзные микробы** среди других людей

Лечение может устранить активную форму туберкулёза

Лечение более длительное (**от шести до 12 месяцев и более**)

## Почему мне следует принимать лекарства от ЛТИ?

Если вы не принимаете лекарства от ЛТИ, туберкулёз может перейти в активную форму.



Активный туберкулёз — это **серьёзная болезнь**, которая может протекать очень тяжело.



**Половину** людей с активным туберкулёзом госпитализируют.

**5%**

людей с активным туберкулёзом умирает от этой болезни.

## Как получить лекарство от ЛТИ?

**Спросите иммиграционного врача, может ли он** заказать для вас лекарство.

Если нет, **сходите к своему лечащему врачу и попросите его выписать вам лекарство**. Возьмите с собой результаты анализов крови.

Вы также можете обратиться в местный департамент здравоохранения, который направит вас в клинику для лечения.

**Если вы не принимаете лекарство, с вероятностью один из десяти** ваш ЛТИ может перейти в активную форму туберкулёза.

**Защитите себя от заражения активным туберкулёзом и распространения его среди своих близких.**