

# Детям старшего возраста и подросткам тоже нужно вакцинироваться!

## Прививки для детей 7–18 лет, рекомендуемые в 2024 г.

Хотите узнать подробнее?

Просканируйте этот QR-код, чтобы узнать, какие вакцины могут потребоваться вашему ребёнку. Или зайдите на сайт [www.cdc.gov/vaccines/tool/teen.html](http://www.cdc.gov/vaccines/tool/teen.html)



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАКЦИНЫ	7 ЛЕТ	8 ЛЕТ	9 ЛЕТ	10 ЛЕТ	11 ЛЕТ	12 ЛЕТ	13 ЛЕТ	14 ЛЕТ	15 ЛЕТ	16 ЛЕТ	17 ЛЕТ	18 ЛЕТ
HPV (папилломавирус человека)			●		●							
Tdap (дифтерия, столбняк, ацеллюлярный коклюш, АКДС) <sup>1</sup>					●							
Менингококковые серогруппы ACWY					●					●		
Менингококк типа B										▨		
Грипп	● Каждый год. Две дозы для некоторых детей		● Каждый год									
COVID-19	● Не менее 1 дозы обновлённой (формула 2023–2024 г.) вакцины против COVID-19.											
RSV (респираторно-синцитиальный вирус)					● Если беременность протекает в сезон активности РС-вируса.							
Мрор (оспа обезьян)												●
Лихорадка денге			● ТОЛЬКО при условии проживания в месте, где распространена лихорадка денге, И если есть лабораторный тест, подтверждающий перенесённую инфекцию денге.									

<sup>1</sup> Рекомендуется одна доза Tdap (АКДС) во время каждой беременности.

### КЛЮЧ

- ВСЕ дети в возрастной группе должны получить вакцину.
- НЕКОТОРЫЕ дети в возрастной группе должны получить вакцину.
- ВСЕ дети в возрастной группе могут получить вакцину.
- ▨ Родителям/опекунам следует проконсультироваться с врачом, чтобы решить, подходит ли эта вакцина их ребёнку.

### Проконсультируйтесь с лечащим врачом своего ребёнка для получения дополнительных рекомендаций, если:

1. У вашего ребёнка есть какое-либо заболевание, которое повышает риск инфицирования, или у ребёнка беременность.
2. Ваш ребёнок выехал за пределы США.
3. Ваш ребёнок пропустил какую-либо прививку, рекомендуемую для его возраста или для младенцев и детей раннего возраста.

[www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)

### ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

позвоните по бесплатному номеру: **1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)**.  
Или зайдите на веб-сайт [www.cdc.gov/vaccines/parents](http://www.cdc.gov/vaccines/parents)

# От каких заболеваний защищают эти вакцины?

ПРОТИВ КАКОЙ БОЛЕЗНИ ВАКЦИНА	ОСЛОЖНЕНИЯ БОЛЕЗНИ	КОЛИЧЕСТВО ДОЗ ВАКЦИНЫ
<b>HPV (вирус папилломы человека)</b> Контагиозная вирусная инфекция; передаётся при тесном прикосновении кожа к коже, в том числе во время секса.	Генитальные бородавки и многие виды рака на более позднем этапе жизни, включая рак шейки матки, влагалища, полового члена, ануса и горла.	2 или 3 дозы
<b>Столбняк (спазм челюстных мышц)*</b> Инфекция, вызываемая бактериальными спорами, повсеместно присутствующими в почве и пыли; споры попадают в организм через раны или повреждённую кожу.	Судороги, переломы костей, затруднённое дыхание, смерть.	1 доза в возрасте 11–12 лет Дополнительные дозы, если пропущены детские дозы. 1 доза при наличии грязных ран
<b>Дифтерия*</b> Контагиозная бактериальная инфекция носа, горла и иногда лёгких; распространяется воздушно-капельным путём и при прямом контакте.	Отёк сердечной мышцы, сердечная недостаточность, кома, паралич, смерть.	1 доза в возрасте 11–12 лет Дополнительные дозы, если пропущены детские дозы.
<b>Коклюш (изнурительный кашель)*</b> Контагиозная бактериальная инфекция лёгких и дыхательных путей; распространяется воздушно-капельным путем и при прямом контакте.	Инфекция лёгких (пневмония), смерть; особенно опасно для младенцев.	1 доза в возрасте 11–12 лет Дополнительные дозы, если пропущены детские дозы. 1 доза при каждой беременности
<b>Менингококковая инфекция**</b> Контагиозная бактериальная инфекция оболочки головного и спинного мозга или кровотока; распространяется воздушно-капельным путем и при прямом контакте.	Утрата руки или ноги, глухота, судороги, смерть.	2 дозы. В зависимости от состояния здоровья или используемой вакцины могут потребоваться дополнительные дозы.
<b>Грипп</b> Контагиозная вирусная инфекция носа, горла и иногда лёгких; распространяется воздушно-капельным путем и при прямом контакте.	Инфекция лёгких (пневмония), инфекции носовых пазух и ушей, ухудшение основных заболеваний сердца или лёгких, смерть.	1 доза каждый год 2 дозы некоторым детям в возрасте от 6 месяцев до 8 лет.
<b>COVID-19</b> Контагиозная вирусная инфекция носа, горла или лёгких; может ощущаться как простуда или грипп. Распространяется воздушно-капельным путем и при прямом контакте.	Инфекция лёгких (пневмония); тромбоз кровеносных сосудов; повреждение печени, сердца или почек; постковидный синдром; смерть.	1 или больше доз обновлённой (формула 2023–2024 г.) вакцины против COVID-19 в зависимости от состояния здоровья. Дополнительные сведения: <a href="https://www.cdc.gov/covidschedule">www.cdc.gov/covidschedule</a>
<b>RSV(респираторно-синцитиальный вирус)</b> Контагиозная вирусная инфекция носа, горла и иногда лёгких; распространяется воздушно-капельным путем и при прямом контакте.	Инфекция лёгких (пневмония) и верхних дыхательных путей; особенно опасно для младенцев и детей раннего возраста.	1 доза на сроке беременности от 32 до 36 недель с сентября по январь на большей части континентальной территории США.
<b>Мрех (оспа обезьян)</b> Контагиозная вирусная инфекция; распространяется при близком, часто кожа к коже, контакте, в том числе половом; вызывает болезненную сыпь, жар, головную боль, усталость, кашель, насморк, боль в горле, увеличение лимфатических узлов.	Инфицированные язвы, отёк головного мозга, инфекция лёгких (пневмония), инфекция глаз, слепота, смерть.	2 дозы
<b>Лихорадка денге</b> Вирусная инфекция; передается через укусы заражённого комара; вызывает жар, головную боль, боль за глазами, сыпь, боль в суставах, боль в теле, тошноту, потерю аппетита, чувство усталости, боль в животе.	Сильное кровотечение, судороги, шок, поражение печени, сердца и лёгких, смерть.	3 дозы

\*Вакцина Tdap (АКДС) защищает от столбняка, дифтерии и коклюша.

\*\*Здоровые подростки: Менингококковая вакцина ACWY (2 дозы); менингококковая вакцина типа B (2 дозы — при необходимости).